

# 豬肺炎黴漿菌 (SEP) 確診流程

## SEP 確診

根據<豬場常見呼吸道疾病診斷流程>所描述之臨床症狀、肉眼病變、組織病理學及分子生物學，綜合判斷是否符合豬肺炎黴漿菌感染 (SEP)?

詳情請點

豬場常見呼吸道疾病診斷流程



是

### 評估感染時間點/來源

- \* 評估疫苗施打時間，疫苗的使用及施打疫苗時豬隻健康狀況。
- \* 與場內獸醫師討論用藥計畫。
- \* 於離乳左右施打百靈佳黴漿菌肺炎不活化菌苗 Ingelvac MycoFLEX®。

### 評估種豬群豬肺炎黴漿菌 (SEP) 的穩定性

- \* 採30頭分娩前新女豬的喉頭拭子及血清。
- \* 採30頭胎次3-6母豬的血清。
- \* 採30頭8-10週齡仔豬的喉頭拭子。
- \* 1個月後再進行第2次採樣。

穩定

- \* 進行場內生物安全的評估及管理。
- \* 離乳左右的仔豬施打百靈佳黴漿菌肺炎不活化菌苗 Ingelvac MycoFLEX®。
- \* 維持管理和用藥計畫。

不穩定

- \* 首要進行新女豬豬肺炎黴漿菌的馴化流程，使種豬群穩定。
- \* 於新女豬、母豬、離乳左右的仔豬施打百靈佳黴漿菌肺炎不活化菌苗 Ingelvac MycoFLEX®。
- \* 加強管理和用藥計畫。

否

### 考量SIV(豬流感)/其它細菌感染

是

與場內獸醫討論用藥、疫苗計畫及管理。

否

重新送檢採樣。